



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

# COVID-19 VAKCINŲ galimi šalutiniai poveikiai

## ASTRA ZENECA

Gamintojas „AstraZeneca“

## COMIRNATY

Gamintojas „BioNTech“ ir „Pfizer“

## MODERNA

Gamintojas „Moderna“

### Organizmo reakcija po vakcinacijos yra normalus procesas

Reakcijos, kurios gali pasireikšti daugiau nei 1 iš 10 asmenų

- Nuovargis
- Skausmas bei jautrumas injekcijos vietoje
- Galvos, raumenų ir sąnarių skausmai
- Šaltkrėtis
- Karščiavimas
- Pykinimas
- Prasta savijauta

- Nuovargis
- Skausmas bei patinimas injekcijos vietoje
- Galvos, raumenų ir sąnarių skausmai
- Šaltkrėtis
- Karščiavimas

- Nuovargis
- Skausmas bei patinimas injekcijos vietoje
- Galvos, raumenų ir sąnarių skausmai
- Šaltkrėtis
- Karščiavimas
- Pykinimas
- Vėmimas

Reakcijos, kurios gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 10 asmenų

- Paraudimas ar patinimas injekcijos vietoje
- Karščiavimas daugiau 38°C
- Vėmimas
- Viduriavimas

- Paraudimas injekcijos vietoje
- Pykinimas

- Paraudimas injekcijos vietoje
- Bėrimas

Reakcijos, kurios gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 100 asmenų

- Apetito sumažėjimas
- Galvos svaigimas
- Prakitavimas
- Pilvo skausmas
- Bėrimas

- Niežėjimas injekcijos vietoje
- Galūnių skausmas
- Padidėję limfmazgiai
- Nemiga
- Prasta savijauta

- Niežėjimas injekcijos vietoje

Reakcijos, kurios gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 1000 asmenų

–

- Laikinas veido pusės paralyžius

- Laikinas raumenų silpnumas vienoje veido pusėje
- Veido patinimas, galintis paveikti žmones, kuriems anksčiau buvo atliktos kosmetinės (užpildų) injekcijos į veidą

Reakcijos, kurios gali pasireikšti, bet dažnumas negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis

- Alerginė reakcija
- Sunki alerginė reakcija

- Alerginė reakcija
- Sunki alerginė reakcija

- Alerginė reakcija
- Sunki alerginė reakcija

Kada gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos po vakcinacijos?

Po **pirmos** vakcinacijos dozės nepageidaujamos reakcijos gali pasireikšti **intensyviau**.

Po **antros** vakcinacijos dozės nepageidaujamos reakcijos gali pasireikšti **intensyviau**.

Po **antros** vakcinacijos dozės nepageidaujamos reakcijos gali pasireikšti **intensyviau**.

Nepageidaujamos reakcijos gali praeiti per keletą valandų. Sveikata pagerėja per kelias dienas po vakcinacijos.