

## Kaip sutrumpinti izoliavimosi laikotarpį?

izoliacijos laikotarpis gali būti sutrumpintas:

- **sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims iki 10 dienų**, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 **PGR tyrimą** ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). **Izoliacija nutraukiama ne nuo neigiamo tyrimo gavimo dienos, bet praėjus ne mažiau kaip 10 izoliacijos dienų.**
- **grįžusiems iš užsienio** ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 **PGR tyrimą** ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). **Izoliacija nutraukiama gavus neigiamą tyrimo, atlikto ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną, rezultatą.**
- **Serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Antigeno testas šiuo atveju taip pat netinkamas.**

Nuoroda:

<https://nvsc.lrv.lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti>

Čia galite užpildyti duomenis ir pateikti tyrimo rezultatą, norėdami susutrumpinti izoliaciją.

[Prašymas sutrumpinti izoliavimosi laikotarpį | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos \(lrvt.lt\)](#)